

Mejor mes de audición y habla - Identificar los signos

por Abby Sakovich M.S., CCC-SLP

Mayo es "Mejor Mes de la Audición y el Habla", un mes dedicado a crear conciencia sobre los trastornos de la comunicación y los profesionales que los tratan. La campaña americana de la Asociación de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus días), Identificar los signos, ayuda a los padres a reconocer signos de trastornos del habla, el lenguaje y la audición y aportan ayuda necesaria para abordar estos trastornos.



Signos de un trastorno del lenguaje



Rango de edad	Signos
2 - 3 meses y más	• no sonríe ni interactúa con los demás
4 - 7 meses	• no balbucea ("bababa")
7 - 12 meses	• muy pocos sonidos o gestos (apuntando)
7 meses - 2 años	• mala comprensión de lo que otros dicen
1 1/2 - 2 años	• todo discurso es difícil de entender para los oyentes familiares
1 1/2 - 3 años	• no combina palabras en oraciones
2 - 3 años	• dificultad para hablar y jugar con sus compañeros
2 1/2 - 3 años	• dificultad con las habilidades tempranas de alfabetización y previas a la escritura

Signos de un trastorno del sonido del habla



Rango de edad	Signos
a los 3 años	• producción incorrecta de sonidos tempranos /p,b,m,h, w/ en palabras
a los 4 años	• producción incorrecta de /k,g,f,t,d,n/ en palabras
a los 5 años	• el habla no está clara, incluso para los oyentes familiares

Signos de un trastorno tartamudo



Rango de edad	Signos
2 1/2 - 3 años	• dificultad para producir sonidos o palabras
2 1/2 - 3 años	• repite el primer sonido de las palabras (b-b-b-baby para "bebé")
2 1/2 - 3 años	• pausas frecuentes de silencio al hablar
2 1/2 - 3 años	• estirar los sonidos mientras se habla (sssss-silly para "tonto")

Signos de un trastorno de la voz



Rango de edad	Signos
Cualquier edad	<ul style="list-style-type: none"> • voz ronca o sonora
Cualquier edad	<ul style="list-style-type: none"> • calidad nasal a la voz

Signos de un problema auditivo



Rango de edad	Signos
Nacimiento - 1 año	<ul style="list-style-type: none"> • poca atención a los sonidos en el medio ambiente
7 meses - 1 año	<ul style="list-style-type: none"> • no responde cuando se llama al nombre
1 - 2 años	<ul style="list-style-type: none"> • dificultad para seguir instrucciones sencillas
Nacimiento - 3 años	<ul style="list-style-type: none"> • retrasos en el desarrollo del habla y/o del lenguaje
Cualquier edad	<ul style="list-style-type: none"> • rascarse o tirar de las orejas
Edad escolar	<ul style="list-style-type: none"> • progreso académico limitado, especialmente matemáticas y/o lectura
Edad escolar	<ul style="list-style-type: none"> • aislamiento social e infelicidad en la escuela
Edad escolar	<ul style="list-style-type: none"> • molestias en los oídos después de la exposición al ruido fuerte

Si cree que su hijo puede tener problemas con el habla, el lenguaje, o escuchar...

No dude en preguntarle al pediatra de su hijo sobre una evaluación de un lenguaje de voz a un certificado Patólogo o Audiólogo. Si su hijo está en la edad escolar, discutir sus preocupaciones con su maestro. Identificar un trastorno de la comunicación temprano juega un papel clave en cuán pronto el tratamiento eficaz y apropiado puede tener lugar.



Recursos:

Identify the Signs of Communication Disorders by the American Speech-Language-Hearing Association. Retrieved 4/13/2017 from www.identifythesigns.org

Más Handy Handouts® GRATIS, visite www.handyhandouts.com