



Handy Handouts®


Folletos educativos gratuitos para maestros y padres

Daño cerebral del hemisferio derecho

por Natalie J. Dahl, MS, CCC-SLP

El daño cerebral del hemisferio derecho, o RHD, ocurre cuando hay daño en el lado derecho del cerebro. Este lado del cerebro no controla el lenguaje tanto como el lado izquierdo del cerebro, pero sí controla las habilidades de pensamiento, que pueden verse afectadas. RHD puede ser causado por lesión cerebral traumática (TBI), accidente cerebrovascular, tumores y/o infecciones.

RHD puede mostrarse de varias maneras. El lado derecho del cerebro controla las siguientes áreas que, si se dañan, pueden causar dificultades a una persona con RHD:



Área afectada:	Causa dificultad con...
 Atención	Enfocándose en una tarea o en lo que él o ella ve o escucha.
 Memoria	Recordar información previamente aprendida y aprendiendo nueva información.
 Organización	Lógicamente reunir información y planificar.
 Orientación	Saber dónde está, la hora o la fecha.
 Percepción	Darse cuenta de que el lado izquierdo del cuerpo existe (esto es llamada negligencia del lado izquierdo).
 Razonamiento y resolución de problemas	Saber que hay un problema o saber cómo resolverlo un problema.
 Comunicación social	Comprensión del lenguaje socialmente aceptable, como chistes o pistas no verbales.



Handy Handouts®

Folletos educativos gratuitos para maestros y padres
(cont.)

Si alguien tiene RHD, un patólogo del habla y el lenguaje (SLP, por sus siglas en inglés) evaluará su habla y habilidades lingüísticas, así como habilidades de atención, memoria, razonamiento y resolución de problemas. Según los resultados de la prueba, el SLP proporcionará terapia para ayudar a mejorar las habilidades. En muchos casos, la persona con RHD no es consciente de sus déficits. Si este es el caso, el SLP puede necesitar ayudar a la persona a tomar conciencia de las dificultades y le proporcionará herramientas para ayuda con las actividades de la vida diaria. Estas herramientas pueden incluir señales de imágenes para ayudar a cocinar comidas o un calendario para ayudar a recordar las rutinas diarias.

El daño cerebral del hemisferio derecho puede tener un efecto significativo en una persona, pero hay pruebas y terapias que pueden ayudar a disminuir las dificultades causadas

por la RHD. El objetivo para una persona con RHD es cuidar de sí mismo tanto como sea posible. Esto puede ser posible con la ayuda de un patólogo del habla y el lenguaje y miembros de la familia que lo apoyen y amigos.



Recursos:

“Injury in Right Hemisphere,” Brain Injury Explanation, accessed May 16, 2018, <https://www.braininjury-explanation.com/consequences/impact-by-brain-area/right-hemisphere>.

“Right Hemisphere Brain Damage (RHD),” ASHA, accessed May 16, 2018, <https://www.asha.org/public/speech/disorders/Right-Hemisphere-Brain-Damage/>

Más Handy Handouts® GRATIS, visite www.handyhandouts.com